

# ADMISSION EN HAD DE L'ANTEPARTUM – RECOMMANDATIONS DE LA HAS (AVRIL 2011) **Annexe 2**



Etiquette patiente

Catherine CHARRIER, sage-femme de l'HAD    Tél : 06 26 20 58 54    Fax : 03 85 56 10 35

Date : \_\_\_\_\_ Sage-femme du service : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

MOTIF D'INCLUSION	CRITERES D'INCLUSION
<input type="checkbox"/> HTA GRAVIDIQUE <input type="checkbox"/> HTA CHRONIQUE	<input type="checkbox"/> TA < 160/110 <input type="checkbox"/> et protéinurie < 0.30 g/l <input type="checkbox"/> et absence d'antécédents (MFIU, HRP, éclampsie, prématurité induite)
<input type="checkbox"/> DIABÈTE GESTATIONNEL <input type="checkbox"/> DIABÈTE PRÉALABLE	<input type="checkbox"/> moyenne des glycémies > 1.5 g /l <input type="checkbox"/> et compréhension des enjeux pour la patiente
<input type="checkbox"/> ATCD DE MFIU	/
<input type="checkbox"/> RCUI	<input type="checkbox"/> entre 5 et 10 percentiles
<input type="checkbox"/> THROMBOPHILIE GÉNÉTIQUE	<input type="checkbox"/> avec RCIU actuel ou antécédents de MFIU
<input type="checkbox"/> CHOLESTASE GRAVIDIQUE	/
<input type="checkbox"/> MENACE ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ	<input type="checkbox"/> au décours d'une hospitalisation et après stabilisation jusqu'à 36/37 SA <input type="checkbox"/> ou plus si d'autres facteurs de risques
<input type="checkbox"/> PLACENTA PRAEVIA	<input type="checkbox"/> au décours d'une hospitalisation et après stabilisation (plus de saignement) <input type="checkbox"/> et avec aide à domicile et téléphone opérationnel
<input type="checkbox"/> PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE	<input type="checkbox"/> non décompensée
<input type="checkbox"/> PROBLÈMES PSYCHO-SOCIAUX	/

○ *Autre(s) motif(s) :* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Nécessité d'une prescription médicale précisant :**

- la fréquence des visites hebdomadaires (minimum 3)
- la fréquence des ERCF + tocographie hebdomadaire (pas de minimum)
- la durée de la surveillance (terme)
- les autres surveillances nécessaires : bandelettes urinaires, analyses d'urines, sanguines, cycle de tension, etc., en précisant la fréquence et la durée
- les éventuels traitements (ordonnance spécifique)